

ESCALA DE AGITAÇÃO E SEDAÇÃO RICHMOND (RASS)

RASS +4 | COMBATIVO

VIOLENTO, LEVANDO A PERIGO IMEDIATO DA EQUIPE DE SAÚDE



RASS +3 | MUITO AGITADO

AGRESSIVO, PODE PUXAR TUBOS E CATETERES



RASS +2 | AGITADO

MOVIMENTOS NÃO INTENCIONAIS, BRIGA COM O RESPIRADOR



RASS +1 | INQUIETO

ANSIOSO, INQUIETO, MAS NÃO AGRESSIVO



RASS 0 | ALERTA E CALMO



RASS -1 | SONOLENTO

ADORMECIDO, FACILMENTE DESPERTÁVEL, MANTÉM CONTATO VISUAL POR APROXIMADAMENTE 10 SEGUNDOS



RASS -2 | SEDAÇÃO LEVE

ACORDA RAPIDAMENTE, E MANTÉM CONTATO OCULAR AO ESTÍMULO VERBAL POR MENOS DE 10 SEGUNDOS



RASS -3 | SEDAÇÃO MODERADA

MOVIMENTO OU ABERTURA DOS OLHOS, MAS SEM CONTATO OCULAR COM O EXAMINADOR



RASS -4 | SEDAÇÃO INTENSA

SEM RESPOSTA AO ESTÍMULO VERBAL, MAS TEM MOVIMENTOS OU ABERTURA OCULAR AO ESTÍMULO TÁTIL/FÍSICO



RASS -5 | COMA

SEM RESPOSTA AOS ESTÍMULOS VERBAIS OU EXAME FÍSICO



*Referências

Ely E, Truman B, Shintani A, et al. Monitoring Sedation Status Over Time in ICU Patients: Reliability and Validity of the Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS). JAMA. 2003;289(22):2983-2991. doi:10.1001/jama.289.22.2983.